


ONCIDIUM

PRESENTATION



- Botanique** Sous-Famille : Epidendroideae, Tribu : Maxillarieae, Sous-Tribu : Oncidiinae.
Ce genre sud américain est composé de 750 espèces.
- Description** Les Oncidium peuvent être épiphytes ou plus rarement se développer sur des talus. Certains oncidium ont des propriétés psychotropes.
- Distribution** On les trouve depuis le niveau de la mer jusqu'à 4000 mètres d'altitude sous, des climats assez variés. On les trouve depuis l'Argentine jusqu'au Etats unis.
- Lumière** Les Oncidium ont besoin d'une luminosité importante sinon ils poussent mais refusent de fleurir. La plante doit être placée à moins de 50cm d'une fenêtre avec 4 à 6 h de soleil direct chaque jour.
- Avril à Octobre: Si possible, sortir la plante à l'extérieur à la mi-ombre dès que les températures nocturnes dépassent 15°C. Éviter le soleil direct de 11h à 15 h qui pourrait brûler les feuilles mais donner le maximum de soleil tamisé possible et du soleil direct en dehors de ces heures.
- Arrosage** Arrosages abondants en été : Le substrat ne doit pas complètement sécher complètement entre les arrosages mais ne doit jamais être détrempé.
Arrosages plus espacés l'hiver. Le substrat doit bien sécher en profondeur entre les arrosages.
- Rempotage** On repote quand le pot devient trop petit ou si le substrat est trop décomposé. Rempoter uniquement au moment de l'apparition des nouvelles racines à la base des nouvelles pousses.
Le substrat doit être bien drainant constitué de charbon de bois, des écorces de pin moyennes. Ajouter 20 à 30 % de mousse de sphaigne hachée pour une meilleure croissance.
Choisir un pot juste assez grand pour contenir 2 autres série de pseudo-bulbes (2 à 4 cm de plus que l'ancien pot).
- Engrais** Les Oncidium sont moyennement gourmands en engrais et leurs racines peuvent être endommagées par des concentrations en engrais trop importantes .
Lorsque la plante est en croissance active (développement de feuilles, racines ou fleurs), fertiliser à chaque arrosage avec un engrais dilué au 1/3 de la dose recommandée